



**Einwirkzeit vor Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut: 2 Min.**

Gebrauchsfertiges Hautantiseptikum für die präoperative Anwendung sowie vor Blutentnahmen und Injektionen.

## kodan® Tinktur forte

### Unser Plus:

- breites antiseptisches Wirkungsspektrum
- schneller Wirkungseintritt (15 Sek. vor Injektion)
- gute Inzisionsfolienhaftung nach Abtrocknung
- sehr gute Hautverträglichkeit
- VAH/DGHM-gelistet

### Anwendungsgebiete

- zur Hautantiseptik vor operativen Eingriffen, vor Injektionen und Blutentnahmen, vor Punktionen sowie vor Exzisionen, Kanülierungen und Biopsien
- zur Wund- und Nahtversorgung
- zur hygienischen Händedesinfektion (nur kodan® Tinktur forte farblos)
- zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Prophylaxe von Hautpilzkrankungen

### Anwendungsmethoden / -hinweise

#### Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Exzisionen etc.:

Betreffende Hautstelle mit kodan® Tinktur forte besprühen oder mit einem getränkten Tupfer abreiben und Einwirkzeit beachten. Bei Verwendung von kodan® Tinktur forte vor Glukose-Testungen (z. B. Hämogluco-Sticks) Präparat gut antrocknen lassen, um eine eventuelle Beeinträchtigung zu vermeiden.

#### Vor Gelenkpunktionen und präoperativer Hautantiseptik:

- Entfernen Sie – wenn erforderlich – die Haare an der betroffenen Hautstelle.
- Baden oder Waschen des Patienten bzw. der betreffenden Hautstelle (z. B. mit esemtan® oder octenisan® Waschlotion) möglichst eine Stunde vor der Hautdesinfektion.
- Auftragen von kodan® Tinktur forte mittels eines sterilen Tupfers oder aufsprühen.
- Sofern Inzisionsfolien verwendet werden, muss vor dem Aufkleben der Folie auf eine ausreichende Abtrocknung von kodan® Tinktur forte geachtet werden, um die Haftung nicht zu beeinträchtigen.
- Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur forte desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind.

### Wund- und Nahtversorgung

Zur Wund- und Nahtversorgung kann kodan® Tinktur forte entweder mit einem sterilen Tupfer aufgetragen oder direkt aufgesprüht werden. Es ist darauf zu achten, dass überflüssige Präparatmengen abfließen können bzw. abgetupft werden. Operationsnähte werden vorzugsweise mit einem getränkten Tupfer abgetupft.

### Hygienische Händedesinfektion

Bei der hygienischen Händedesinfektion sollten die Hände während der gesamten Einwirkzeit gut angefeuchtet bleiben.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

- Bakterizid inkl. Mykobakterien (TbB) • fungizid • begrenzt viruzid\* (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes simplex Viren) • viruzid gegen Rota- und Adenovirus

### Einwirkzeiten

| Anwendungsgebiet/Keime  | Anwendungsempfehlung/<br>Einwirkungszeit               |
|---|--|
| <b>Talgdrüsenarme Haut (gemäß VAH-/DGHM-Zerifikat):</b><br>• Vor Injektionen und Blutentnahmen:<br>• Vor Gelenkpunktionen:<br>• Zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion: | 15 Sek.<br>60 Sek.<br>60 Sek.                          |
| <b>Vor Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut im Bereich des Schädels und der Stirn wiederholt auftragen</b>  | 2 Min.   |
| <b>Hygienische Händedesinfektion (gemäß VAH-/DGHM-Zerifikat):</b>   | 3 ml kodan® Tinktur forte farblos unverdünnt – 30 Sek. |
| <b>MRSA</b>   | 30 Sek.  |
| <b>Viren:</b><br><b>begrenzt viruzid* (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes simplex Viren):</b><br>Rotavirus<br>Adenovirus   | 15 Sek.<br>30 Sek.<br>10 Min.                          |
| <b>ÖGHMP-Liste</b><br>(nur kodan® Tinktur forte farblos)<br>Hygienische Händedesinfektion:  | unverdünnt 3 ml während 30 Sek. einreiben              |

\* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

# kodan® Tinktur forte

## Produkt Daten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

45,0 g 2-Propanol, 10,0 g 1-Propanol, 0,20 g 2-Biphenylol

Sonstige Bestandteile:

Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser

kodan® Tinktur forte gefärbt enthält zusätzlich die Farbstoffe

E 104, E 110, E 151.

## Chemisch-physikalische Daten:

### gefärbt

Aussehen: braun  
Dichte: 0,896 ± 0,003 g/cm<sup>3</sup>

### farblos

Aussehen: farblos  
Dichte: 0,896 ± 0,003 g/cm<sup>3</sup>  
Temperaturstabilität: stabil zwischen -5 °C und +40 °C  
Flammpunkt: 24 °C (nach DIN 51 755)

## Besondere Hinweise

kodan® Tinktur forte wird unverdünnt angewendet, dabei ist auf eine vollständige Benetzung der zu behandelnden Hautareale zu achten.

Zur äußeren Anwendung. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Brennbar. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

| Gebindegrößen                         | Verpackungseinheiten | Art. Nr. |
|---------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>kodan® Tinktur forte farblos</b>   |                      |          |
| 6 ml-Tupfflasche                      | 40 x 6 ml            | 104 021  |
| 250 ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe | 10 x 250 ml          | 104 005  |
| 1 l-Flasche                           | 10 x 1 l             | 104 007  |
| 2 l-Flasche                           | 5 x 2 l              | 104 006  |
| <b>Anstaltspackungen</b>              |                      |          |
| 250 ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe | 10 x 250 ml          | 104 012  |
| 1 l-Flasche                           | 10 x 1 l             | 104 007  |
| 2 l-Flasche                           | 5 x 2 l              | 104 010  |
| <b>kodan® Tinktur forte gefärbt</b>   |                      |          |
| 250 ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe | 10 x 250 ml          | 104 802  |
| 1 l-Flasche                           | 10 x 1 l             | 104 804  |
| 2 l-Flasche                           | 5 x 2 l              | 104 803  |

## Zubehör / Dosierhilfen

|   | Art. Nr. |
|---|----------|
| Sprühkopf für 1 l-Flasche (1 Sprühstoß = 1,2 ml +/- 0,1 ml) | 180 112  |
| Tupfer-Dispenser für 1 l-Flasche                            | 129 003  |

Detaillierte Informationen finden Sie in der s&m-Präparate-Information „Zubehör und Dosierhilfen“.

## Umweltinformation

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

### kodan® Tinktur forte farblos

• **Zusammensetzung:** Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. • **Sonstige Bestandteile:** Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. • **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a. Zur Wund- und Nahtversorgung. Zur hygienischen Händedesinfektion. Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. • **Gegenanzeigen:** Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. • **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur forte farblos abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur forte farblos desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. -V01-

### kodan® Tinktur forte gefärbt

• **Zusammensetzung:** Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. • **Sonstige Bestandteile:** Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. • **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Wund- und Nahtversorgung, zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. • **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. • **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur forte gefärbt abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur forte gefärbt desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. • **Pharmazeutischer Unternehmer:** Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt  
Zul.-Nr. 1272.00.00 kodan® Tinktur forte farblos  
Zul.-Nr. 1272.00.01 kodan® Tinktur forte gefärbt  
-V01-



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0  
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)