










Desinfektionsplan Physiotherapie

Was	Womit	Wann	Wie	Zubereitung der Lösung
 Händewaschen	esemtan® wash lotion	Vor Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende, bei sichtbar verschmutzten Händen	Hände waschen, gut nachspülen und mit Einmalhandtuch abtrocknen.	Gebrauchsfertige Waschlotion Wie handelsübliche Präparate anwenden
 Händedesinfektion	desderman® pure / gel, desmanol® pure	Vor und nach Behandlung, bei sichtbarer Verschmutzung, vor und bzw. nach Benutzung von Handschuhen	<u>Hygienische Händedesinfektion</u> : 3 ml 30 Sekunden in den Händen einreiben <u>Chirurgische Händedesinfektion</u> : 5 ml 90 Sekunden einreiben	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
 Händepflege	esemtan® skin lotion	Vor grossen Pausen, nach Arbeitsende	Nach dem Händewaschen und / oder der Händedesinfektion die Lotion gut einreiben.	Gebrauchsfertige Handlotion
 Hautdesinfektion	kodan® forte farblos, octeniderm®	Vor operativen Eingriffen, Injektionen und Punktionen	Betreffende Hautstelle mit Desinfektionsmittel benetzen und einwirken lassen. Injektionen: 15 Sekunden. Punktionen: 60 Sekunden	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
 Schleimhaut-, Wund-, und Hautdesinfektion, Verbrennungen	octenisept®	Vor diagnostischen und operativen Massnahmen, zur Wundbehandlung	Mit Tupfer auftragen, die zu desinfizierenden Stellen vollständig benetzen und 1 Minute einwirken lassen.	Gebrauchsfertige, wässrige Lösung
 Chirurgisches Instrumentarium, Anästhesiezubehör und starre Endoskope	gigasept® Instru AF	Nach jedem Gebrauch	Instrumente einlegen, nach 30 Minuten Einwirkzeit mechanisch reinigen, abspülen und ggf. sterilisieren. Die Einsatzkonzentration / Einwirkzeit nach EN / prEN lautet: 3,0% – 15 Min. 2,0% – 30 Min. 1,5% – 60 Min. Im Ultraschall: 3,0% / 5 Minuten (Standzeit der Lösung 1 Tag).	<u>2,0% Desinfektionslösung</u> 20 ml gigasept® Instru AF und 980 ml Wasser = 1000 ml Desinfektionslösung Standzeit der Lösung: 7 Tage
 Alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten, Geräten, Mobiliar und Flächen aller Art	mikrocid® AF liquid, wipes, wipes Jumbo, wipes premium	Nach jeder Benutzung	Oberflächen mit mikrocid® AF gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Alkoholische gebrauchsfertige Lösung / Tücher (Acrylglas, lackiertes Holz nicht mit mikrocid® AF behandeln!)
 Schnelldesinfektion für alkoholempfindliche Oberflächen von Medizinprodukten, Geräten, Mobiliar und Flächen aller Art	mikrocid® universal liquid, wipes premium	Nach jeder Benutzung von alkoholempfindlichen Flächen	Oberflächen mit mikrocid® universal gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Gering alkoholische gebrauchsfertige Lösung / Tücher
	mikrocid® sensitive liquid, wipes, wipes premium	Nach jeder Benutzung von alkoholempfindlichen Flächen	Oberflächen mit mikrocid® sensitive gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung / Tücher
 Fussböden, Sanitärbereich, Inventar, Geräte und Mobiliar	terralin® protect	Täglich oder nach Kontamination und Verschmutzung	Flächen feucht-nass abwischen / Handschuhe tragen. Einwirkzeit: 1 Stunde	<u>0,5% Desinfektionslösung</u> 5 ml Konzentrat auf und 995 ml Wasser = 1000 ml Desinfektionslösung