

# Produktübersicht

Octenidin. Vielfalt aus einer Hand.




we protect lives  
worldwide

# Octenidin:


## Zwischen Tradition und Innovation

Octenidin ist als antimikrobieller Wirkstoff bereits seit mehr als 3 Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz und aus den verschiedensten Anwendungsgebieten nicht mehr wegzudenken. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Problematik (multi)resistenter Erreger und der damit einhergehenden limitierten Therapieoptionen ist Octenidin dank seines breiten Wirkspektrums und hohen Sicherheitsprofils selbst über 35 Jahre nach erstmaliger klinischer Verwendung aktueller denn je.



### breites antiseptisches Wirkspektrum inkl. „Problemkeime“

bakterizid und fungizid, inkl. (multi)resistenter Erreger (z. B. 3/4 MRGN, Mupirocin-resistente MRSA, ESBL, VRE, *Candida spp.*); begrenzt viruzid (z. B. Corona Virus, HBV, HIV, HCV)<sup>1-16</sup>



Octenidin-basierte Produkte haben einen besonderen Vorteil:  
Durch den Einsatz desselben Inhaltsstoffes sind sie ideal kombinierbar.  
Unerwünschte Wechselwirkungen der Produkte sind damit ausgeschlossen.

Entdecken Sie  
die einzigartige  
Wirkungsweise.  
Erklärt in 2 Minuten.



Produkt

Wundversorgung

octenisept®

Wund- und Schleimhaut-antiseptikum

octenisept® Gel

Wundgel

octenilin®

Wundgel

octenilin®

Wundspüllösung

Ihre Vorteile

- breites antiseptisches Wirkungsspektrum
- schneller Wirkungseintritt ab 1 Minute
- gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- unterstützt die Wundreinigung
- auch für Säuglinge & Frühgeborene geeignet
- Anwendung während der Schwangerschaft & Stillzeit möglich
- farblos und schmerzfrei

- hält die Wunde feucht und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess
- bildet eine Schutzschicht gegen Keime
- hilft, die Narbenbildung zu reduzieren
- lindert den Juckreiz (auch bei Insektenstichen)
- kühlender Effekt (ideal bei Sonnenbrand & leichten Verbrennungen)
- auch für Babys & Kinder geeignet
- Anwendung während der Schwangerschaft & Stillzeit möglich
- farblos und schmerzfrei

- hält die Wunde feucht und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess
- bildet eine Schutzschicht gegen Keime
- verbessert die Narbenqualität bei Applikation auf die chirurgische Wunde unmittelbar nach Wundverschluss
- für langfristige und großflächige Anwendungen
- farblos, schmerzfrei und geruchsabsorbierend
- steril

- hervorragende Reinigungsleistung
- besonders gewebeverträglich
- für alle Wundsituationen einsetzbar
- schnelle Beseitigung von unangenehmen Wundgeruch
- farblos und schmerzfrei
- für den wiederholten und langfristigen Gebrauch
- zum kombinierten Einsatz in der Unterdrucktherapie (V.A.C.Ult<sup>TM</sup>)
- in Kombination mit dem **schülke wound pad** können Wunden gereinigt werden
- steril

Anwendung

Wundbehandlung:

Antiseptische Behandlung von akuten, chronischen und chirurgischen Wunden sowie Verbrennungswunden.

Schleimhautantiseptik:

Vor diagnostischen und operativen Eingriffen im Ano- und Uro-Genitalbereich (z.B. vor dem Einsetzen von Spiralen, vor prä-, intra- und post-natalen Manipulationen oder vor dem Veröden von Hämorrhoiden) und im Oralbereich (z.B. vor Zahnextraktionen oder Kürettagen).

Zur präoperativen Hautantiseptik im schleimhautnahen Bereich. Vor dem Legen transurethraler Einmal- und Dauerkatheter. Zur Pflege der Kathetereintrittsstelle (z.B. ZVK), gemäß KRINKO Empfehlung auch bei Säuglingen & Frühgeborenen.<sup>23</sup>

Therapie von Vaginalinfektionen:

octenisept® 50 ml in Kombination mit dem Vaginal Applikator (separat erhältlich) zur Therapie von unkomplizierten bakteriellen Infektionen und Infektionen durch Pilze im Vulvovaginalbereich.

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Jahre.

Gebrauchsfertiges Arzneimittel – nicht zur Verdünnung geeignet.

Bei akuten **Hautverletzungen, Schnittwunden** und **leichten Verbrennungen** im Alltag, im Urlaub und beim Sport.

Unser Tipp für die Haus- und Reiseapotheke:

Die frische Wunde zunächst mit octenisept® Spray desinfizieren und anschließend octenisept® Gel bis zur vollständigen Wundheilung auftragen und gegebenenfalls mit einem Verband oder Pflaster abdecken.

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

Zur **Befeuchtung und Reinigung** von **akuten und chronischen Wunden** (z.B. zum Lösen hartnäckiger Wundbeläge) sowie zur Versorgung von **Verbrennungswunden**.

Mit **allen Verbandstoffen kompatibel** (z.B. Alginate, Gaze, Hydrofaser, Hydrokolloide, Schaumstoffe). octenilin® Wundgel verbleibt bis zum nächsten Verbandwechsel auf der Wunde. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Beschaffenheit der Wunde und der Menge an Exsudat ab und ist der jeweiligen Wundsituation anzupassen, sollte jedoch nach max. 3 Tagen erfolgen.

Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Wochen (20 ml Faltenbalg) bzw. 8 Wochen (250 ml Tube).

Schnelle und effektive Wundreinigung, z.B. zur Entfernung von Wundbelägen, nekrotischem Gewebe, Biofilm und Fibrinbelägen. Auch für schwer zugängliche Oberflächen geeignet.

Zum **Befeuchten der Wunde** sowie für die sanfte Entfernung von schwer lösaren, verkrusteten Verbänden bzw. Wundauflagen.

In Kombination mit dem schülke wound pad zum schmerzfreien Abtragen von Fibrin und Debris sowie zur Anregung der lokalen Durchblutung des Wundgebiets.

Haltbarkeit nach Anbruch: 8 Wochen.

Hautantiseptik

octeniderm®

Alkoholisches Haut-antiseptikum

octenisan® md

Nasengel

octenisan®

Waschlotion

octenisan®

SET

octenisan®

Waschhandschuhe

octenisan®

Waschhaube

Ihre Vorteile

- Rekordremanenz von 48 Stunden
- schneller Wirkungseintritt ab 15 Sekunden
- sehr gute Hautverträglichkeit
- entspricht der KRINKO-Empfehlung zur „Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen“<sup>43</sup>
- farblos, mögliche Veränderungen der Haut können rasch entfernt werden
- gute Inzisionsfolienhaftung nach Abtrocknung
- VAH gelistet

- milde und schonende Ganzkörperwaschung (Haut und Haare)
- auch bei Besiedelung mit multiresistenten Erregern (z.B. MRSA)
- besonders geeignet vor operativen Eingriffen sowie zum Einsatz auf Intensiv- und Infektionsstationen
- für alle Hauttypen, auch bei Seifenüberempfindlichkeit bzw. allergieempfindlicher Haut
- hautneutraler pH-Wert
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch getestet

- **octenisan® Waschlotion** und **octenisan® md Nasengel** zur präoperativen Dekontamination im praktischen Set
- für eine Anwendung von bis zu 5 Tagen vor der Operation
- gibt Sicherheit: umfangreiche Patienteninformation für eine sichere Anwendung der Produkte und zur Erhöhung der Compliance
- schafft Vertrauen: für das gute Gefühl des Patienten, in besten Händen zu sein

- schnelle, zuverlässige und sanfte Reinigung und Dekontamination der Haut ohne Wasser
- auch bei Besiedelung mit multiresistenten Erregern (z.B. MRSA)
- gebrauchsfertig – einfache Anwendung durch praktisches Handschuhformat
- leave-on Produkt (kein Nachspülen notwendig)
- besonders hautschonend durch zusätzliche Pflege mit Allantoin
- flauschig-weiches Tuchmaterial
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch getestet

- schnelle, zuverlässige und sanfte Dekontamination von Haaren und Kopfhaut ohne Wasser
- gebrauchsfertig – einfache Anwendung
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch getestet

Anwendung

Zur **Befeuchtung und Dekontamination der Nasenvorhöfe** sowie zur unterstützten **Wundbehandlung bei Läsionen des Nasenepithels**.

Bei Bedarf 2–3x täglich anwenden. Dazu eine erbsengroße Menge<sup>46</sup> an octenisan® md Nasengel auf ein Wattestäbchen auftragen und das Gel in die Flächen der Nasenvorhöfe einbringen. Durch seitliches Zusammendrücken der Nasenflügel gleichmäßig verteilen und überschüssiges Gel entfernen.

Nicht für Kinder unter 1 Jahr geeignet.

Nach Anbruch bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

Im Rahmen von gezielten Dekontaminationsmaßnahmen nach einem Zyklus verwerfen.

Zur **Dekontamination für Haut und Haare** auf Basis ausgesuchter Pflegesubstanzen (z.B. Allantoin) und Tenside, die einem Austrocknen der Haut entgegenwirken.

Die octenisan® Waschlotion unverdünnt und gleichmäßig auf den gesamten Körper inkl. Haare auftragen (bei Bedarf kann auch ein frischer Waschlappen verwendet werden), dabei besonders auf Achseln, Bauch und Unterleib achten, und nach einer empfohlenen Kontaktzeit von 1 Minute wieder abwaschen.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bei einer zeitlich begrenzten präoperativen Anwendung auch bei Kindern nach dem 3. Lebensmonat einsetzbar.

Nach Anbruch bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

Zur **präoperativen Ganzkörperdekontamination von Haut, Haaren und Nasenvorhöfen**. Klinische Studien zeigen, dass die präoperative Ganzkörperdekontamination wesentlich zur Reduktion von postoperativen Wundinfektionen beitragen kann. Häufig stammen Erreger, die solche Komplikationen verursachen, von der eigenen Haut oder auch aus der Nase des Patienten.

Bis zu 5 Tage vor der Operation wird empfohlen, die beiden Produkte wie folgt anzuwenden:

- 2–3x täglich octenisan® md Nasengel
- 1x täglich octenisan® Waschlotion

Unmittelbar nach der Anwendung können weitere Haut- und Haarpflegeprodukte benutzt werden. Wir empfehlen nur frisch geöffnete Produkte, um eine mögliche Rekontamination auszuschließen. Nach dem Duschen frische Kleidung anziehen.

Keine Daueranwendung – nur für den Zeitraum vor einer geplanten Operation!

Keine Daueranwendung – nur für den Zeitraum vor einer geplanten Operation!

Gezielte, präventive oder präoperative Patientendekontamination

octenimed®

Antiseptische Mundspül-lösung

octenident®

Mundspül-lösung

Ihre Vorteile

- gebrauchsfertiges Arzneimittel zur Antiseptik in der Mundhöhle
- vorübergehende Keimzahlreduktion
- vorübergehende Hemmung der Plaque-Bildung
- schneller Wirkungseintritt in 30 Sekunden
- breites Wirkspektrum inkl. Gram-negativer Bakterien
- auch in der Schwangerschaft anwendbar
- mit Minzaroma
- chlorhexidinfrei
- alkoholfrei

- gebrauchsfertige Lösung zur täglichen hygienischen Mundpflege
- hemmt geruchsbildende Keime
- sorgt für einen frischen Atem
- keine Verfärbung der Zähne
- chlorhexidinfrei
- alkoholfrei

Anwendung

Zur vorübergehenden **Keimzahlreduktion in der Mundhöhle** (z.B. vor endodontischen, prothetischen, mund-, kiefer- oder gesichtschirurgischen Eingriffen und Zahnextraktionen) sowie zur vorübergehenden **Hemmung der Plaque-Bildung** (die Hauptursache von **Gingivitis, Parodontitis und Karies**), selbst wenn keine mechanische Zahnreinigung erfolgt.<sup>47</sup> Auch bei **eingeschränkter Fähigkeit zur Mundhygiene** (z.B. Patienten auf Intensivstationen).

Zur **Reduktion des Risikos nosokomialer Infektionen**. Erfüllt die Anforderungen der KRINKO-Empfehlung zur **Prävention der beatmungssoziierten Pneumonie (VAP)**.<sup>48</sup>

Nur zur oberflächlichen Anwendung in der Mundhöhle, nicht zur Spülung von Parodontaltaschen, Wurzelkanälen oder Kavitäten.

Bei Bedarf die Mundhöhle 2x täglich mit 10 ml octenimed® ca. 30 Sekunden spülen. Nicht schlucken. Nicht länger als fünf Tage hintereinander anwenden.

Für Erwachsene ab 18 Jahren.

Haltbarkeit nach Anbruch: 8 Wochen.

Zur Vermeidung und Vorbeugung von **Mundgeruch**, zur **Bekämpfung von geruchsbildenden Bakterien im Mundraum** und bei **eingeschränkter Fähigkeit zur Mundhygiene**.

Bei Bedarf die Mundhöhle 2–3 x täglich ca. 30 Sekunden spülen. Nicht schlucken. Essen und Trinken ist unmittelbar nach der Anwendung möglich.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Nach Anbruch bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

Mundhygiene

octenimed®

Antiseptische Mundspül-lösung

octenident®

Mundspül-lösung

Ihre Vorteile

- gebrauchsfertiges Arzneimittel zur Antiseptik in der Mundhöhle
- vorübergehende Keimzahlreduktion
- vorübergehende Hemmung der Plaque-Bildung
- schneller Wirkungseintritt in 30 Sekunden
- breites Wirkspektrum inkl. Gram-negativer Bakterien
- auch in der Schwangerschaft anwendbar
- mit Minzaroma
- chlorhexidinfrei
- alkoholfrei

- gebrauchsfertige Lösung zur täglichen hygienischen Mundpflege
- hemmt geruchsbildende Keime
- sorgt für einen frischen Atem
- keine Verfärbung der Zähne
- chlorhexidinfrei
- alkoholfrei

Anwendung

Zur vorübergehenden **Keimzahlreduktion in der Mundhöhle** (z.B. vor endodontischen, prothetischen, mund-, kiefer- oder gesichtschirurgischen Eingriffen und Zahnextraktionen) sowie zur vorübergehenden **Hemmung der Plaque-Bildung** (die Hauptursache von **Gingivitis, Parodontitis und Karies**), selbst wenn keine mechanische Zahnreinigung erfolgt.<sup>47</sup> Auch bei **eingeschränkter Fähigkeit zur Mundhygiene** (z.B. Patienten auf Intensivstationen).

Zur **Reduktion des Risikos nosokomialer Infektionen**. Erfüllt die Anforderungen der KRINKO-Empfehlung zur **Prävention der beatmungssoziierten Pneumonie (VAP)**.<sup>48</sup>

Nur zur oberflächlichen Anwendung in der Mundhöhle, nicht zur Spülung von Parodontaltaschen, Wurzelkanälen oder Kavitäten.

Bei Bedarf die Mundhöhle 2x täglich mit 10 ml octenimed® ca. 30 Sekunden spülen. Nicht schlucken. Nicht länger als fünf Tage hintereinander anwenden.

Für Erwachsene ab 18 Jahren.

Haltbarkeit nach Anbruch: 8 Wochen.

Zur Vermeidung und Vorbeugung von **Mundgeruch**, zur **Bekämpfung von geruchsbildenden Bakterien im Mundraum** und bei **eingeschränkter Fähigkeit zur Mundhygiene**.

Bei Bedarf die Mundhöhle 2–3 x täglich ca. 30 Sekunden spülen. Nicht schlucken. Essen und Trinken ist unmittelbar nach der Anwendung möglich.


Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Nach Anbruch bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

# Bestellinformationen:

| Produkte                                                | Gebindegröße      | VE          | Art.-Nr. | PZN     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|---------|
| octenisept®                                             | 50 ml-Flasche     | 20 x 50 ml  | 121422   | 1876970 |
|                                                         | 100 ml-Flasche    | 20 x 100 ml | 70003565 | 5758492 |
|                                                         | 250 ml-Flasche    | 10 x 250 ml | 121414   | 1876987 |
|                                                         | 500 ml-Flasche    | 20 x 500 ml | 121467   | 3522934 |
|                                                         | 1 l-Flasche       | 10 x 1 l    | 121416   | 1877082 |
| Vaginal Applikator für octenisept®                      | 1 Stk.            | 20 x 1 Stk. | 70001128 | 4733805 |
| octenisept® Gel                                         | 20 ml-Tube        | 20 x 20 ml  | 121605   | 3303505 |
| octeniderm®                                             | 250 ml-Flasche    | 10 x 250 ml | 70000008 | 1493861 |
|                                                         | 1 l-Flasche       | 10 x 1 l    | 118221   | 1493878 |
| octenilin® Wundgel <span>erstattungsfähig</span>        | 20 ml-Faltenbalg  | 20 x 20 ml  | 121602   | 3253581 |
|                                                         | 250 ml-Tube       | 6 x 250 ml  | 121616   | 4520251 |
| octenilin® Wundspüllösung <span>erstattungsfähig</span> | 350 ml-Flasche    | 10 x 350 ml | 121701   | 3424114 |
| schülke wound pad <span>erstattungsfähig</span>         | blau / weiß / rot | 4 x 3 Stk.  | 146010   | 4490030 |
|                                                         | blau              | 10 x 1 Stk. | 146011   | 4490047 |
| octenisan® Waschlotion                                  | 150 ml-Flasche    | 30 x 150 ml | 121501   | 3702777 |
|                                                         | 500 ml-Flasche    | 20 x 500 ml | 121505   | 3732488 |
| octenisan® Waschhandschuhe                              | 8 Waschhandschuhe | 30 x 8 Stk. | 70003201 | 4262406 |
| octenisan® Waschhaube                                   | 1 Waschhaube      | 24 x 1 Stk. | 129602   | 4262412 |
| octenisan® md Nasengel                                  | 6 ml-Tube         | 20 x 6 ml   | 70002281 | 4492448 |
| octenisan® SET                                          | 1 Stk.            | 10 x 1 Stk. | 70003054 | 4492945 |
| octenimed® Antiseptische Mundspüllösung                 | 250 ml-Flasche    | 12 x 250 ml | 70003152 | 5475742 |
| octenident® Mundspüllösung                              | 250 ml-Flasche    | 10 x 250 ml | 70003584 | 5167035 |
| octenisept® protect & repair cream                      | 50 ml-Tube        | 20 x 50 ml  | 70003022 | 5709424 |

## Das richtige Produkt für jede Phase der Wundheilung:

|                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                    |                               |  |  |
| Phase der Wundheilung | 1. Phase:<br>Exsudation bzw. Inflammation                                                                                             | 2. Phase:<br>Proliferation bzw. Granulation                                                                      | 3. Phase:<br>Epithelisierung                                                         | 4. Phase:<br>Regeneration, Prophylaxe und Hautpflege                                  |
| Maßnahme & Produkt    | Reinigung<br>octenilin® Wundspüllösung<br>schülke wound pad<br><br>Antiseptik<br>octenisept®<br><br>Befeuchtung<br>octenilin® Wundgel | Reinigung<br>octenilin® Wundspüllösung<br><br>Antiseptik<br>octenisept®<br><br>Befeuchtung<br>octenilin® Wundgel | Förderung der Wundheilung<br>octenilin® Wundgel                                      | Schutz und Pflege<br>octenisept® protect & repair cream                               |

### Referenzen

1 Conceição et al., 2016 | 2 Conceicao et al., 2019 | 3 Alvarez-Marín et al., 2017 | 4 Spettel et al., 2022 | 5 Ponnachan et al., 2019 | 6 Radischat et al., 2020 | 7 Schedler et al., 2017 | 8 Gugsch et al., 2023 | 9 Koburger et al., 2010 | 10 Pitten et al., 2003 | 11 Augustin et al., 2023 | 12 interne Gutachten auf Anfrage | 13 Al-Doori et al., 2007 | 14 Steinhauer et al., 2021 | 15 Smeets et al., 2022 | 16 Korbecka-Paczowska und Karpiński 2024 | 17 Hübner et al., 2010 | 18 Assadian, 2016 | 19 Lescat et al., 2022 | 20 Spettel et al., 2025 | 21 Karpiński et al., 2024 | 22 Tang et al., 2024 | 23 Denkel et al., 2022 | 24 Htun et al., 2019 | 25 Hardy et al., 2018 | 26 Malanovic et al., 2020 | 27 Malanovic et al., 2022 | 28 Vejzovic et al., 2022 | 29 Fang et al., 2023 | 30 Lutz et al., 2016 | 31 Wisgrill et al., 2017 | 32 Felgate et al., 2024 | 33 Ali et al., 2012 | 34 Bühner et al., 2002 | 35 KRINKO „Prävention von Gefäßkatheter-assoziierten Infektionen bei Früh- und Neugeborenen“; Bundesgesundheitsblatt 2018 | 36 European Medicines Agency "orphan drug status" EMA/COMP/264905/2010 | 37 Novakov Mikić und Stojic, 2015 | 38 Briese et al., 2011 | 39 Novakov Mikić & Budakov, 2010 | 40 Friese et al., 2003 | 41 Friese et al., 2000 | 42 Insight Health D08 Antiseptik, 12/2024 | 43 KRINKO „Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen“; Bundesgesundheitsblatt 2017 | 44 Dettenkofer et al., 2009 | 45 Tschelaut et al., 2018 | 46 Pichler et al., 2017 | 47 Jockel-Schneider et al., 2021 | 48 KRINKO „Prävention der nosokomialen beatmungsassoziierten Pneumonie“; Bundesgesundheitsblatt 2013

# Intimgesundheit: Ein starkes Team bei Scheideninfektionen

## octenisept® + Vaginal Applikator



wirkt gegen  
**Bakterien und Pilze** <sup>37-41</sup>




auch in der **Schwangerschaft**  
anwendbar <sup>37, 38</sup>




zur **Partnerbehandlung**  
geeignet



**farblos, einfach  
und diskret**




Video zur  
richtigen  
Anwendung.



## Neugierig geworden?

Stöbern Sie in unserem umfassenden Sortiment an Katalogen, Broschüren und Flyern und erfahren Sie mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Octenidin-basierten Produktpalette sowie alles rund um die Themen Infektionsprävention und Hygiene.



[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[www.octenisept.at](http://www.octenisept.at)  
[www.octenisan.at](http://www.octenisan.at)

### Fachkurzinformationen

**octeniderm®** — Lösung zur Hautdesinfektion | Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 30,0 g 1-Propanol, 45,0 g 2-Propanol, 0,1 g Octenidindihydrochlorid. Anwendungsgebiete: octeniderm® ist ein Antiseptikum zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien sowie zur zeitlich begrenzten Nahtversorgung und zur zeitlich begrenzten Prävention katheterassoziierter Infektionen. octeniderm® weist eine remanente Wirkung von 48 h auf. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. octeniderm® soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut angewendet werden. Abgabe: rezeptfrei, apothekenpflichtig. Wirkstoffgruppe: Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiseptika und Desinfektionsmittel, ATC-Code: D08AJ57, Octenidin, Kombinationen. Zulassungsinhaber: Schülke & Mayr Ges.m.b.H., A-1070 Wien, Tel. (+43) 1/523 25 01. Stand der Information: 03.2017. Weitere Angaben wie Dosierung und Art der Anwendung, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

**octenimed®** — 1 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle | Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält 1 mg Octenidindihydrochlorid; sonstige Bestandteile: Macrogolglycerolhydroxystearat (17,6mg/ml); Glycerol 85% (E 422); Natrium-D-gluconat; Citronensäure; Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat (zur pH-Wert-Einstellung); Sucralose; gereinigtes Wasser; Minzaroma (enthält Propylenglycol (E 1520)). Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Keimzahlreduktion in der Mundhöhle; zur vorübergehenden Hemmung der Plaque-Bildung; bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit; octenimed® wird angewendet bei Erwachsenen. Das Spektrum der antimikrobiellen in vitro Wirksamkeit von octenimed® umfasst Gram-positive und Gram-negative Bakterien sowie Hefepilze. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe: Hals- und Rachen therapeutika; Antiseptika; ATC-Code: R02AA21; Zulassungsnummer: 140916 Zulassungsinhaber: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt; E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com); rezeptfrei, apothekenpflichtig. Stand der Information: Mai 2021. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie ggf. Gewöhnungseffekte sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

**octenisept®** — Lösung zur Wund- und Schleimhautdesinfektion | Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g 2-Phenoxyethanol. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und Übergangsepithel vor operativen Eingriffen, - in der Mundhöhle z. B. vor Zahnextraktionen oder Kürettagen, - im Urogenitaltrakt z. B. vor Hysterektomien - und im Rektalbereich z. B. vor dem Veröden von Hämorrhoiden. Im Vulvovaginalbereich mittels Applikator-Sprühkopf bei unkomplizierten bakteriellen Infektionen und Infektionen durch Pilze. Zur zeitlich begrenzten Wund- und Nahtversorgung sowie zur zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung infizierter Wunden der Haut. octenisept® kann bei Erwachsenen und Kindern ohne Altersbegrenzung eingesetzt werden. Die Unbedenklichkeit und Sicherheit der Anwendung ist auch bei Frühgeborenen ab der 24. Schwangerschaftswoche nachgewiesen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Vorsichtsmaßnahmen: Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z. B. Drainage, Lasche). Hilfsstoffe: (3-Cocofettsäure-amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Abgabe: rezeptfrei, apothekenpflichtig. Wirkstoffgruppe: Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiseptika und Desinfektionsmittel, ATC-Code: D08AJ57; Octenidin, Kombinationen. Zulassungsinhaber: Schülke & Mayr Ges.m.b.H., Seidengasse 9, A-1070 Wien. Stand der Information: 01.2019. Weitere Angaben wie Dosierung und Art der Anwendung, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen oder Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

**Schülke & Mayr GmbH**  
1070 Wien | Österreich  
Telefon +43 1 523 25 01-0  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)



[youtube.com/schuelkeChannel](https://www.youtube.com/schuelkeChannel)

AT0173 | DE | 09.26 | welldone