

KAŻDA RĘKA MA ZNACZENIE

w walce z patogenami



PRZED
kontaktem
z pacjentem

PRZED
przystąpieniem
do zadania
wymagającego
warunków
aseptycznych

PO
wystąpieniu
ryzyka kontaktu
z płynami ustrojowymi

PO
kontakcie z otoczeniem
pacjenta

PO
kontakcie z pacjentem

5 MOMENTÓW DEZYNFEKCJI RĄK



STOSOWANIE RĘKAWIC NIE ZASTĘPUJE DEZYNFEKCJI RĄK




Kiedy po dezynfekcji rąk
nie zachodzi potrzeba zastosowania
dodatkowo rękawic?

- Przed kontaktem z nienaruszoną i niezmienną chorobowo skórą pacjenta
- Przed przystąpieniem do wykonywania procedur niezwiązanych z narażeniem na kontakt z krwią lub innym materiałem potencjalnie zakaźnym (np.: iniekcje podskórne i ew. domięśniowe)

Kiedy po dezynfekcji rąk należy
zastosować dodatkowo rękawice?

- Przy opiece nad pacjentami z chorobą zakaźną
- W przypadku procedur inwazyjnych^{1,2}, przed wykonaniem punkcji, kaniulacji naczyń, iniekcji dożylnych i ew. domięśniowych (zawsze w kontekście ryzyka kontaktu z krwią lub innym materiałem potencjalnie zakaźnym)
- Przed bezpośrednim kontaktem z silnie skażonymi powierzchniami
- W kontekście ryzyka przeniesienia patogenów odpornych na działanie alkoholowych preparatów do dezynfekcji (np. spory)



Nie każda procedura wymaga użycia rękawic. W wielu sytuacjach wystarczająca jest higieniczna dezynfekcja rąk, co dodatkowo ogranicza ilość odpadów i przekłada się korzystnie na środowisko naturalne. Ręce należy obowiązkowo zdezynfekować przed założeniem nowych rękawic oraz po ich zdjęciu.

¹ Do procedur inwazyjnych należy stosować rękawice jałowe.

² Bundesgesundheitsblatt 2016 · 59:1189–1220, DOI 10.1007/s00103-016-2416-6