

Chirurgische Händedesinfektion

Einreibemethode für die chirurgische Händedesinfektion (gem. EN 12791)

Bei optisch sauberen Händen ist eine Händewaschung vor der chirurgischen Händedesinfektion laut RKI nicht erforderlich.

Ausnahme: Um eine potentielle Kontamination mit Bakteriosporen auszuschließen (keine sporizide Wirkung alkoholischer Händedesinfektionsmittel), ist eine Händewaschung vor Dienstbeginn bzw. spätestens vor Anlegen der OP-Kleidung vorzunehmen.

Schritt 1

Händedesinfektionsmittel in die trockene Hand geben.

Dabei Spender mit dem Ellenbogen betätigen.



Schritt 3

Hände gezielt desinfizieren.

Dabei die Standard-Einreibemethode der hygienischen Händedesinfektion befolgen.



Schritt 2


Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen **mind. 1,5 Min.*** mit dem Händedesinfektionsmittel einreiben.



Schritt 4

Hände während und nach dem Einreiben über Ellenbogen-niveau halten.

Die Hände müssen vor dem Anlegen der OP-Handschuhe lufttrocken sein.



Hände und Unterarme müssen während der gesamten Einwirkzeit (mind. 1,5 Min.*) mit dem Desinfektionsmittel benetzt sein.

* Die Einwirkzeit ist vom Präparat abhängig. Händedesinfektionsmittel von schülke haben eine nachgewiesene Wirksamkeit von 1,5 Min. bei der chirurgischen Händedesinfektion.