schülke

Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten auf Basis von Aktiv-Sauerstoff

CE 0297

perform® pro

Unser Plus

- sehr gute Materialverträglichkeit
- breites Wirkspektrum (viruzid, tuberkulozid, sporizid (C. difficile))
- auf Basis von Aktiv-Sauerstoff

Anwendungsgebiet

perform® pro ist für die Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten geeignet. Durch die Weiterentwicklung eines sehr gut etablierten Produkts mit breitem Wirkspektrum und hoher Materialverträglichkeit findet perform® pro Anwendung in allen Krankenhausbereichen. Darüber hinaus wurde das Produkt so weiterentwickelt, dass es auch den aktuellen Anforderungen der Biozidverordnung entspricht.

Anwendungshinweise

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung Eimer mit Wasser (max. 30° C) füllen, Produkt hinzugeben und lösen:

- 1 Beutel (40 g) auf 8 l Wasser = 0,5%ige Lösung
- 2 Beutel (80 g) auf 8 l Wasser = 1%ige Lösung

Beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäss dem Dosen-Etikett. Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen über eine Standzeit von 24 Stunden (≤ 25° C) und 4 Stunden (≤40° C) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Gebrauchslösung bei deutlich sichtbarer Verschmutzung erneuern.Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

Flächendesinfektion: Die Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration im 2-Stufen Wisch-Verfahren auf Fussböden ausbringen. Flächen feucht wischen. Zur Vermeidung von Rückstandsbildungen sollte nach dem 2. Wischvorgang nur eine minimale Restfeuchte auf der Fläche verbleiben. BAuA-Nr.: N-110043

Mikrobiologische Wirksamkeit

Empfohlene Gebrauchskonzentration*

	Testmethode	1 %	3 %	0,5 %	2 %
Bakterielle Sporen					
sporizid (C. difficile)	Suspension + Keimträger Versuch EN 17126; EN 17846	60 Min. 20 °C	30 Min. 20 °C		
sporizid	Suspensionsversuch EN 17126		60 Min. 20 °C		
Bakterien, Hefen und Mykobakterien					
bakterizid	Suspension + Keimträger Versuch gemäss VAH-Richtlinien mit kurzen Einwirkzeiten EN 17387	60 Min. 5 Min.** 20 °C	5 Min.** 20 °C	60 Min. 20 °C	
levurozid	Suspension + Keimträger Versuch gemäss VAH-Richtlinien mit kurzen Einwirkzeiten	60 Min. 5 Min.** 20 °C	5 Min.** 20 °C	60 Min. 20 °C	
mykobakterizid	Suspensionsversuch EN 14348				60 Min.** 20 °C

*inkl. Phase 2/ Stufe 1 und Phase 2/ Stufe 2 Testung
**geringe Belastung
0,5 % = 5 g/l; 1 % = 10 g/l; 2 % = 20 g/l; 3 % = 30 g/l
Angaben aller Konzentrationen unter hoher Belastung
Hinweis: Beschreibung zu den Testnormen finden Sie auf unserer Website.

perform® pro

Mikrobiologische Wirksamkeit

Empfohlene Gebrauchskonzentration*

	Testmethode	1 %	3 %	0,5 %	2 %
Pilze und Sporen					
fungizid	Keimträgerversuch EN 17387				60 Min. 20 °C
Viren					
begrenzt viruzid PLUS	Suspension + Keimträger Versuch EN 14476; EN 16777	5 Min.** 20 °C		5 Min. 20 °C	
viruzid	Suspension + Keimträger Versuch EN 14476; EN 16777	60 Min. 5 Min.** 20 °C	5 Min.** 20 °C	60 Min. 20 °C	

*inkl. Phase 2/ Stufe 1 und Phase 2/ Stufe 2 Testung
**geringe Belastung
0,5 % = 5 g/l; 1 % = 10 g/l; 2 % = 20 g/l; 3 % = 30 g/l
Angaben aller Konzentrationen unter hoher Belastung
Hinweis: Beschreibung zu den Testnormen finden Sie auf unserer Website.

Zertifikate / Normen

VAH

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g enthalten: 49,5 g
Pentakaliumbis(peroxymonosulfat)bis(sulfat). Enthält:
Dinatriumdihydrogen(1-hydroxyethyliden)bisphosphonat,Natriumdodecylsulfat, (+)-Weinsäure

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Das Tragen von Handschuhen ist erforderlich. Bei starker Verschmutzung Gebrauchslösung vorzeitig wechseln. Die Gebrauchslösung kann auf sehr empfindliche Textilfarbstoffe bleichend wirken. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für ausreichende Belüftung am Ort des Gebrauchs sorgen. perform® pro ist zudem für die Desinfektion von Atemschutz- und Inhalationsmasken sowie Übungspuppen geeignet. Reinigen Sie die Ausrüstung und das Medizinprodukt gründlich mit Wasser. Oder tauchen Sie zerlegte Teile von Medizinprodukten in die Gebrauchslösung ein. Nach der erforderlichen Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. **Ausschliesslich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt**

Bestellinformation

Artikel		Lieferform	GTIN	Art.-Nr.
perform pro (60x)	40 g BT	60 / Karton(e)	4032651985180	70003654

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie unter www.schuelke.ch

Für individuelle Fragen:
Customer Sales Service
Telefon: +41 44 466 55 44
E-Mail: mail.ch@schuelke.com

schülke

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com

EMAS DQS MED DQS MED

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

/ 913813-CH-de-CH-01.06.2025
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.