



Lek stosowany w przedzabiegowej dezynfekcji skóry

true

octeniderm® płyn

Zalety

- szybkie działanie i wysychanie,
- szerokie spektrum bójcze
- bez zawartości chlorheksydyny i jodu
- nie podrażnia skóry
- zawiera octenidynę
- bardzo dobre właściwości odtłuszczające
- produkt leczniczy

Obszar zastosowania

- dezynfekcja skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, punkcjami, biopsjami, iniekcjami, zdejmowaniem szwów, opatrywaniem ran
- higieniczna dezynfekcja rąk
- zapobieganie grzybicom skóry

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, dichlorowodorek octenidyny lub na którykolwiek ze składników leku.

Właściwości produktu

Produkt leczniczy octeniderm® działa na bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Produkt octeniderm® działa na takie drobnoustroje jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym

MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* oraz bakterie z rodzajów *Klebsiella* i *Proteus*) oraz mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*), grzybobójczo na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) oraz dermatofity (jak *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton rubrum* oraz *Microsporum gypseum*), wirusobójczo, m. in. na HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B, adenowirusy oraz wirusa *herpes simplex*. Produkt leczniczy octeniderm® ma co najmniej 48 godzinny efekt rezydualny. Postać farmaceutyczna: Płyn na skórę. Przezroczysty, bezbarwny.

Właściwości farmakodynamiczne - grupa farmakoterapeutyczna: Leki dezynfekujące i antyseptyczne; propanol i leki złożone zawierające propanol. Kod ATC: D 08 AX 53.

Wskazówki dotyczące stosowania

Lek octeniderm® stosuje się bez rozcieńczania.

- Dezynfekcja skóry przed iniekcjami i punkcjami:

Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć lekiem octeniderm® przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi na 15 sekund, przed punkcjami na 60 sekund.

- Przedoperacyjna dezynfekcja skóry:

Jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne. Wykąpać pacjenta używając np. emulsji do mycia esemtan® lub octenisan®



najlepiej godzinę przed planowanym terminem zabiegu. Nanosić octeniderm® przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez jedną minutę pamiętając o dokładnym zwilżeniu pola operacyjnego. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu leku.

- Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów:

Dane produktu

100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0.10 g, 1-propanol 30.00 g, 2-propanol 45.00 g, substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Wskazówki i specjalne środki ostrożności dotyczącego stosowania. • Lek do stosowania na skórę. • Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Wrazie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego octeniderm® z oczami należy natychmiast opłukać otwarte oczy dużą ilością wody przez kilka minut. • Unikać wdychania oparów. • Usunąć nadmiar produktu leczniczego, aby uniknąć jego nagromadzenia się. • Produkt leczniczy łatwopalny. Nie rozpoczynać termokauteryzacji na skórze przed dokładnym wyschnięciem dezynfekowanych obszarów. • Ze względu na wysoką zawartość alkoholu produkt leczniczy octeniderm® nie może być stosowany u wcześniaków i noworodków z niedojrzałą skórą, ponieważ może powodować oparzenia z powodu ograniczonej funkcji barierowej naskórka. Produkt leczniczy octeniderm® nie należy używać łącznie z antyseptykami na bazie PVP-jodu (kompleks jodu z powidonem) na sąsiadujących partiach ciała, ponieważ może dojść do silnych brązowych, a nawet fioletowych przebarwień. octeniderm® jako produkt leczniczy kationowy może w połączeniu z anionowymi środkami myjącymi lub detergentami spowodować trudno rozpuszczalne pozostałości. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Zwrócić uwagę na niską temperaturę zapłonu należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania. Lek łatwopalny. Nie stosować leku po upływie terminu ważności. Termin ważności: 5 lat.

Powiązane produkty

- **kodan® forte coloured**
- **kodan® forte colourless**
- **octenisan® wash lotion emulsja myjąca**
- **octenisan® wash mitts rękawiczki**
- **octenisept® płyn**

schülke +

Dystrybutor
Schülke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132 132
02-305 Warszawa | Poland
Telefon +48 22 11 60 700
www.schuelke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Producent
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefon +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
MZ nr 13057

Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ust.1 niemieckiej Ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat zgodności GMP.